

Pflichttext

Epi-Pevaryl® 1% Creme und P.v. 1% Lösung

Qualitative und quantitative Zusammensetzung:

1% Creme: 1 g Creme enth. 10 mg Econazolnitrat.

P.v. 1% Lösung: 10 g Lösung (entspr. 1 Beutel) enth. 100 mg Econazol.

Sonstige Bestandteile: *1% Creme:* Gereinigtes Wasser, Macrogolstearat, Macrogolglycerololeate (Ph. Eur.), dickflüss. Paraffin, Benzoessäure, Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.).

P.v. 1% Lösung: Gereinigtes Wasser; N-(2-Hydroxyethyl)-N-(lauramidoethyl)glycin, Natriumsalz; (3,6,9-Trioxadocosyl)hydrogensulfat, Natriumsalz; Isopropanol; Polysorbat 20; Polyethylenglycol-6000-distearat; Sorbitanlaurat; Benzylalkohol.

Anwendungsgebiete: *1% Creme:* Bei Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen, zur Therapie v. Mykosen d. Haut u. Hautfalten, z. B. Tinea pedis, Pityriasis versicolor, auch b. Pilzinfektionen, die b. einer Antibiotika- oder Steroidtherapie auftreten.

P.v. 1% Lösung: Bei Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen, zur Therapie der Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor).

Gegenanzeigen: *1% Creme:* Überempfindlichkeit geg. d. Wirkstoff od. einen d. sonstigen Bestandteile.

P.v. 1% Lösung: Überempfindlichkeit geg. d. Wirkstoff, Benzylalkohol od. einen d. sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: *Häufig:* Pruritus, Brennen d. Haut, Schmerzen am Verabreichungsort. Gelegentlich: Erythem, Unbehagen, Schwellung am Verabreichungsort. *Nicht bekannt:* Überempfindlichkeit, Angioödem, Kontaktdermatitis, Hautausschlag, -schuppen, Urtikaria, Blasenbildung.

Zulassungsinhaber: *1% Creme:* Trimb Healthcare AB

P.v. 1% Lösung: Karo Pharma AB,

Adresse beider Zul.inhaber:

Box 16184,

103 24 Stockholm, Schweden.

Stand d. Information:

April 2023

Pflichttext

Lamisil Creme 10 mg/g

Zusammensetzung: *Wirkstoff:* 1 g Creme enthält 10 mg Terbinafinhydrochlorid sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), Polysorbat 60, Cetylalkohol (Ph.Eur.), Stearylalkohol (Ph.Eur.), Cetylpalmitat (Ph.Eur.), Sorbitanstearat, Benzylalkohol, Natriumhydroxid.

Anwendungsgebiete: Pilzinfektionen der Haut, wie z.B. Fußpilz (Athletenfuß, Sportlerfuß = Tinea pedis); Hautpilzkrankungen an den Oberschenkeln und am Körper (Tinea corporis); Hautpilzkrankungen in der Leistengegend (Tinea cruris); Hautcandidose; Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor), die durch Dermatophyten, Hefen oder andere Pilze (Pityrosporum orbiculare/Malassezia furfur) verursacht werden.

Gegenanzeigen: Allergie gegen Terbinafinhydrochlorid, Benzylalkohol od. einen d. sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: *häufig:* Hautabschuppung, Pruritus *gelegentlich:* Hautläsion, Schorf, Hautveränderung, Pigmentierungsstörung, Erythem, Brennen, Schmerzen, Schmerzen oder Reizung an der Applikationsstelle *selten:* Augenreizung, trockene Haut, Kontaktdermatitis, Ekzem, Verschlimmerung der Grunderkrankung *nicht bekannt:* Überempfindlichkeit, Hautausschlag oder Papeln; allergische Reaktion auf Benzylalkohol.

Inhaber der Zulassung:
Karo Healthcare AB,
Box 16184,
10324 Stockholm, Schweden

Stand: 11/2023.

Pflichttext

Lamisil Once 1 %

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Zusammensetzung: *Wirkstoff:* 1 g Lösung z. Anw. auf d. Haut enthält 10 mg Terbinafin (als Hydrochlorid).

Anwendungsgebiete: Lamisil Once wird angewendet zur Behandlung von Tinea pedis (Fußpilzerkrankung) bei Erwachsenen.

Warnhinweis: : Nur zum äußerlichen Gebrauch. Kontakt mit den Augen vermeiden. Enthält Ethanol: offene Flammen vermeiden.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: *gelegentlich:* Reaktionen an der Anwendungsstelle wie Hauttrockenheit, Hautirritationen oder brennendes Gefühl *sehr selten:* allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Dermatitis bullosa u. Urtikaria *nicht bekannt:* Abschälung der Haut, Hautverfärbungen, Erythem, Schmerzen an der Anwendungsstelle, Augenreizungen.

Inhaber der Zulassung:

Karo Healthcare AB,
Box 16184,
10324 Stockholm, Schweden

Stand: 11/2023.

Pflichttext

Lamisil Spray 1 %

Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Zusammensetzung: *Wirkstoff:* Terbinafinhydrochlorid
sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Ethanol 96 %, Propylenglycol, Macrogolcetylstearylether.

Anwendungsgebiete: Lamisil Spray wird angewendet bei Pilzinfektionen der Haut an den Füßen, im Leistenbereich, am Körper sowie bei Kleinpilzflechte (Pityriasis versicolor).

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: *Häufig:* Hautabschuppung, Pruritus
gelegentlich: Hautläsion, Schorf, Hautveränderung, Pigmentierungsstörung, Erythem, brennendes Gefühl auf der Haut, Schmerzen, Schmerzen an der Applikationsstelle, Reizung an der Applikationsstelle
selten: Augenreizungen, Hauttrockenheit, Kontaktdermatitis, Ekzem, Verschlimmerung der Grunderkrankung
nicht bekannt: Überempfindlichkeit, Hautausschlag.

Inhaber der Zulassung:

Karo Healthcare AB,
Box 16184,
10324 Stockholm, Schweden

Stand: 11/2023.